

第一讲 预备知识：线性代数基础

- 1 线性空间与内积空间
- 2 矩阵与投影
- 3 向量范数与矩阵范数
- 4 矩阵标准型
- 5 几类特殊矩阵
- 6 Kronecker 积

1 | 线性空间与内积空间

数域与线性空间

- ▶ 数域, 如: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$
- ▶ 线性空间, 如: $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n, \mathbb{R}^{n \times n}, \mathbb{R}^{m \times m}, \mathbb{R}^{m \times n}, C[a, b]$
- ▶ 线性相关与线性无关, 秩, 基, 维数
- ▶ 子空间: 判别, 和, 维数公式
- ▶ 直和: $S = S_1 \oplus S_2$
- ▶ 仿射子空间 (线性流形)



为了描述方便, 线性空间中的元素通常称为**向量**.

内积空间

内积与内积空间

➤ 内积与内积空间的定义

➤ 常用内积

- $\mathbb{R}^n / \mathbb{C}^n$: $(x, y) = y^T x$ / $(x, y) = y^* x$ (标准内积, 点积)

- $\mathbb{R}^{m \times n}$: $(A, B) = \text{tr}(B^T A)$

- $C[a, b]$: $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) \, dx$

 注: 以上是常用内积, 但并不是唯一内积.

正交与正交补

正交: 向量与向量, 向量与子空间, 子空间与子空间 (见讲义或线代教材)

定理 设 S_1, S_2 是内积空间 S 的两个子空间, 如果 $S_1 \perp S_2$, 则 $S_1 + S_2$ 是直和.

(留作课外自习)

定义 (正交补) 设 S_1 是内积空间 S 的一个子空间, 则 S_1 的**正交补**定义为

$$S_1^\perp \triangleq \{ x \in S : x \perp S_1 \},$$

即 S 中所有与 S_1 正交的元素组成的集合.

可以证明 $S_1^\perp$ 也是子空间, 且

定理 设 S_1 是内积空间 S 的一个有限维子空间, 则 $S_1^\perp$ **存在唯一**, 且

$$S = S_1 \oplus S_1^\perp.$$

例 (正交基) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^n$. 若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关, 则 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基. 进一步, 如果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 相互正交, 即

$$(x_i, x_j) = x_j^T x_i = 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n,$$

则称它们是一组**正交基**. 如果还满足

$$(x_i, x_i) = x_i^T x_i = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

则称它们是一组**标准正交基**或**规范正交基**.

特别地, 记 e_i 为单位矩阵的第 i 列, 则 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基, 这组基通常称为**自然基**.



任何一组基都可以通过 Gram-Schmidt 正交化过程构造标准正交基.

2 | 矩阵与投影

矩阵的秩、特征值、特征向量

- ▶ 矩阵的秩
- ▶ 特征多项式, 特征值, 特征向量, 左特征向量, 特征对
- ▶ 代数重数和几何重数, 特征空间
- ▶ 零化多项式, 最小多项式
- ▶ 可对角化, 特征值分解/谱分解, 可对角化的充要条件



为了讨论方便, 本节仅考虑实数情形, 对于复数情形, 结论类似.

矩阵与线性变换

矩阵与线性变换

 设 f 是 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的**线性变换**, 则存在唯一的矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 使得

$$f(x) = Ax, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

即 **线性变换与矩阵一一对应**.

 设 f 是 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的**仿射变换** (Affine Transformation), 则 f 可表示为

$$f(x) = Ax + b, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$.

矩阵秩分解

定理 (秩分解) 设 $\text{rank}(A) = \ell$, 则存在非奇异矩阵 $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 和 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$A = P \begin{bmatrix} I_\ell & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q.$$

进一步, $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ 当且仅当存在非奇异矩阵 $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 和 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A = PBQ$.

推论 (满秩分解) 设 $\text{rank}(A) = \ell$, 则存在非奇异矩阵 $F \in \mathbb{R}^{m \times \ell}$ 和 $G \in \mathbb{R}^{\ell \times n}$ 使得

$$A = FG.$$

秩的更多性质

定理 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$, 则

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - k \leq \text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}.$$

推论 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times m}$, $k \leq m$. 若 A 和 B 都是满秩矩阵, 则

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA) = \text{rank}(A) = \text{rank}(B) = k.$$

张成的线性空间

设 $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$, 记

$$\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_k\} \triangleq \{ \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k : \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R} \},$$

为由 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 张成的线性空间

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 相关的四个子空间

- 列空间, 像空间, 值域: $\text{Ran}(A) = \text{span}\{A\}$
- 零空间, 核: $\text{Ker}(A) \triangleq \{ x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0 \}$
- 行空间: $\text{Ran}(A^T) = \text{span}\{A^T\}$
- 左零空间: $\text{Ker}(A^T)$

定理 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则有

- $\dim(\text{Ran}(A)) = \dim(\text{Ran}(A^T)) = \text{rank}(A)$;
- $\dim(\text{Ker}(A)) + \dim(\text{Ran}(A^T)) = n$;
- $\text{Ran}(A^T A) = \text{Ran}(A^T)$, $\text{Ker}(A^T A) = \text{Ker}(A)$.

例 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则

$$\text{Ran}(A)^\perp = \text{Ker}(A^T).$$

(留作课外自习)

例 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则由上例可知

$$\text{Ker}(A) \oplus \text{Ran}(A^T) = \mathbb{R}^n, \quad \text{Ker}(A^T) \oplus \text{Ran}(A) = \mathbb{R}^m.$$

特征值与特征向量

特征值相关性质: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

- ▶ 右特征值, 左特征值, 代数重数, 几何重数, 特征子空间
- ▶ 特征多项式, 零化多项式, 最小多项式
- ▶ $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = \det(A)$
- ▶ $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = \operatorname{tr}(A)$ (矩阵的迹: $\operatorname{tr}(A) \triangleq a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$)
- ▶ 矩阵的谱: $\sigma(A) \triangleq \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \}$
- ▶ 谱分解/特征值分解 (可对角化): $X^{-1}AX = \Lambda$ 或 $A = X\Lambda X^{-1}$
- ▶ 矩阵的谱半径: $\rho(A) \triangleq \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$
- ▶ 相似变换, 合同变换
- ▶ 特征值关于矩阵元素的连续性

 思考:

- 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则 A^T 与 A 的特征值和特征向量是什么关系?
- A^{-1} 与 A 的特征值和特征向量是什么关系?
- 设 $p(t)$ 是多项式或有理函数, 则 $p(A)$ 与 A 的特征值和特征向量是什么关系?

特征值估计: Bendixson 定理

定理 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, H 和 S 分别为 A 的 Hermite 部分和 Skew-Hermite 部分:

$$H \triangleq \frac{1}{2}(A + A^*), \quad S \triangleq \frac{1}{2}(A - A^*),$$

则

$$\lambda_{\min}(H) \leq \operatorname{Re}(\lambda(A)) \leq \lambda_{\max}(H),$$

$$\lambda_{\min}(-\mathbf{i}S) \leq \operatorname{Im}(\lambda(A)) \leq \lambda_{\max}(-\mathbf{i}S).$$

其中 $\operatorname{Re}(\cdot)$ 和 $\operatorname{Im}(\cdot)$ 分别表示实部和虚部, $\mathbf{i}$ 是虚部单位. 即: **特征值的实部的取值范围由其 Hermite 部分确定, 而虚部则由其 Skew-Hermite 部分确定.**

特征值估计: Gerschgorin 圆盘

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 A 的 **Gerschgorin 圆盘** (盖尔圆盘) 定义为

$$\mathcal{D}_i \triangleq \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \right\}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

定理 (Gerschgorin 圆盘定理) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 A 的所有特征值都包含在 A 的 Gerschgorin 圆盘的并集中, 即 $\sigma(A) \subset \bigcup_{i=1}^n \mathcal{D}_i$. (留作课外自习, 证明见讲义)

定理 若 $\bigcup_{i=1}^n \mathcal{D}_i$ 可分解成两个不相交的子集 S 和 T , 其中 S 由 k 个圆盘组成, T 由其它 $n - k$ 个圆盘组成, 则 S 恰好包含 A 的 k 个特征值, 而 T 则包含其它 $n - k$ 个特征值.

不变子空间

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 子空间 $\mathbb{S} \subseteq \mathbb{R}^n$. 若 $A\mathbb{S} \subseteq \mathbb{S}$, 即对任意 $x \in \mathbb{S}$, 都有 $Ax \in \mathbb{S}$, 则称 $\mathbb{S}$ 为 A 的一个不变子空间

一类特殊的不变子空间

设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是 A 的一组线性无关的特征向量, 则 $\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 是 A 的一个 m 维不变子空间.

不变子空间的重要性质

定理 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $X \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 且 $\text{rank}(X) = k$, 则 $\text{span}(X)$ 是 A 的不变子空间的充要条件是存在一个矩阵 $B \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 使得

$$AX = XB,$$

此时, B 的特征值都是 A 的特征值.

(板书)

推论 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $X \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 且 $\text{rank}(X) = k$. 若存在 $B \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 使得 $AX = XB$, 则 (λ, v) 是 B 的特征对当且仅当 (λ, Xv) 是 A 的特征对.

(留作课外自习)

投影变换

设 $S = S_1 \oplus S_2$, 则 S 中的任意向量 x 都可唯一表示为

$$x = x_1 + x_2, \quad x_1 \in S_1, x_2 \in S_2.$$

我们称 x_1 为 x 沿 S_2 到 S_1 上的投影, 记为 $x|_{S_1}$.

💡 由于 S_1 的补空间不唯一, 因此在讨论投影时要明确给定 S_2 .

例 设 $S_1 = \text{span}\{e_1\}$, $S_2 = \text{span}\{e_2\}$, $\tilde{S}_2 = \text{span}\{e\}$, 其中 $e_1 = [1, 0]^T$, $e_2 = [0, 1]^T$, $e = [1, 1]^T$. 于是有

$$\mathbb{R}^2 = S_1 \oplus S_2 = S_1 \oplus \tilde{S}_2.$$

$x = [2, 3]^T$ 沿 S_2 到 S_1 上的投影是 $[2, 0]^T$, 沿 $\tilde{S}_2$ 到 S_1 上的投影是 $[-1, 0]^T$.

投影变换与投影矩阵

定义线性变换 $P: \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$ 如下:

$$Px = x|_{\mathbb{S}_1}$$

- 称 P 是从 $\mathbb{S}$ 沿 $\mathbb{S}_2$ 到 $\mathbb{S}_1$ 上的 **投影变换** 或 **投影算子**
- 对应的变换矩阵称为 **投影矩阵**

几点注记

- 线性变换在不同的基下对应不同的变换矩阵.
在不加特别指出时, 本讲义中如果线性空间是 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{R}^{n \times n}$, 我们采用自然基.
- 为书写方便, 我们使用 P 既表示投影变换也表示其对应的投影矩阵.

投影矩阵由其像空间和零空间唯一确定

设 P 是从 S 沿 S_2 到 S_1 上的投影变换, 则容易验证

$$\text{Ran}(P) = S_1, \text{Ker}(P) = S_2 \implies \mathbb{R}^n = \text{Ran}(P) \oplus \text{Ker}(P)$$

定理 若 S_1 和 S_2 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个子空间, 且 $\mathbb{R}^n = S_1 \oplus S_2$, 则存在唯一的投影矩阵 P , 使得

$$\text{Ran}(P) = S_1, \quad \text{Ker}(P) = S_2.$$

 该结论表明: 投影矩阵由其像空间和零空间所唯一确定, 也就是说, 对于给定的子空间 S_1 和 S_2 (构成直和 $S = S_1 \oplus S_2$), **从 S 沿 S_2 到 S_1 上的投影变换是唯一的.**

 若 $S_1 = \mathbb{R}^n$, 则 $S_2 = \{0\}$, 所对应的投影矩阵即为单位矩阵 I .

 若 $S_1 = \{0\}$, 则 $S_2 = \mathbb{R}^n$, 此时所对应的投影矩阵即为零矩阵.

投影矩阵的一个简单性质

引理 设 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是一个投影矩阵, 则

- (1) $I - P$ 也是一个投影矩阵, 且 $\text{Ker}(P) = \text{Ran}(I - P)$;
- (2) P^T 也是一个投影矩阵.

投影矩阵的判别

定理 矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是投影矩阵的充要条件是 $P^2 = P$.

(留作课外自习)

投影变换的矩阵表示

设 S_1 和 S_2 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个 m 维子空间, 且 $\mathbb{R}^n = S_1 \oplus S_2^\perp$, 则存在唯一的投影变换 P , 使得

$$\text{Ran}(P) = S_1, \quad \text{Ker}(P) = S_2^\perp.$$

此时, 我们称 P 是 S_1 上与 S_2 正交的投影矩阵.

定理 设 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是 S_1 上与 S_2 正交的投影变换, $v_1, v_2, \dots, v_m$ 和 $w_1, w_2, \dots, w_m$ 分别构成 S_1 和 S_2 的一组基, 则

$$P = V(W^\top V)^{-1}W^\top,$$

其中 $V = [v_1, v_2, \dots, v_m]$, $W = [w_1, w_2, \dots, w_m]$.

(留作练习)

正交投影变换

设 $\mathbb{S}_1$ 是内积空间 $\mathbb{S}$ 的一个子空间, $x \in \mathbb{S}$, 则 x 可唯一分解成

$$x = x_1 + x_2, \quad x_1 \in \mathbb{S}_1, \quad x_2 \in \mathbb{S}_1^\perp,$$

其中 x_1 称为 x 在 $\mathbb{S}_1$ 上的正交投影.

- ▶ 若 P 是沿 $\mathbb{S}_1^\perp$ 到 $\mathbb{S}_1$ 上的投影变换, 则称 P 为 $\mathbb{S}_1$ 上的正交投影变换, 对应的矩阵为 正交投影矩阵, 记为 $P_{\mathbb{S}_1}$
- ▶ 非正交投影变换称为 斜投影变换

正交投影变换的矩阵表示

设 P 是 $\mathbb{S}_1$ 上的正交投影变换, 则

$$P = VV^{\mathrm{T}},$$

其中 $V = [v_1, v_2, \dots, v_m]$ 的列向量组构成 $\mathbb{S}_1$ 的一组 **标准正交基**.

正交投影的判别

定理 投影矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正交投影矩阵的充要条件 $P^{\mathrm{T}} = P$.

(留作练习)

3 | 向量范数与矩阵范数

向量范数

定义 (向量范数) 若函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (或 $f: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{R}$) 满足

- (1) $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$), 等号当且仅当 $x = 0$ 时成立;
- (2) $f(\alpha x) = |\alpha| \cdot f(x), \forall x \in \mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$), $\alpha \in \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$);
- (3) $f(x + y) \leq f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$);


则称 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 上的 **范数**, 通常记作 $\|x\|$.

如果 f 只满足 $f(x) \geq 0$, 以及 (2) 和 (3), 则称为 **半范数**.

$\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$ 上常见的向量范数

- ▶ 1-范数: $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$;
- ▶ 2-范数: $\|x\|_2 = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2}$;
- ▶ ∞ -范数: $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$;
- ▶ p -范数: $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$

例 (p -范数举例)



p -范数也称为 Hölder 范数或 ℓ_p 范数.

范数的连续性

定理 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 上的一个向量范数, 则 $f(x) \triangleq \|x\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 上的连续函数.

(留作课外自习, 利用范数的三角不等式)

范数的等价性

定义 设 $\|\cdot\|_\alpha$ 与 $\|\cdot\|_\beta$ 是 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 上向量范数, 若存在正常数 c_1, c_2 , 使得

$$c_1\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_2\|x\|_\alpha$$

对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 都成立, 则称 $\|\cdot\|_\alpha$ 与 $\|\cdot\|_\beta$ 是等价的.

定理 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 上的所有向量范数都是等价的, 特别地, 有

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2, \|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty, \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$$

(板书, 以 $\mathbb{R}^n$ 为例, 只证明等价性, 三个不等式留作练习)



事实上, 有限维赋范线性空间上的所有范数都是等价的.

事实上, 我们有

$$\|x\|_p \geq \|x\|_q, \quad \forall 1 \leq p \leq q.$$

(留作课外自习)

定理 (Cauchy-Schwarz 不等式) 设 $(\cdot, \cdot)$ 是 $\mathbb{C}^n$ (或 $\mathbb{R}^n$) 上的内积, 则对任意 $x, y \in \mathbb{C}^n$ (或 $\mathbb{R}^n$), 有

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x) \cdot (y, y)$$

且等号成立的充要条件是 x 与 y 线性相关.

(板书)

中学数学中的 Cauchy 不等式



$$(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2) (b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2),$$

是 Cauchy-Schwarz 不等式的特例.

更一般地, 我们有下面的 Holder 不等式.

定理 (Holder 不等式) 设 $(\cdot, \cdot)$ 是 $\mathbb{C}^n$ (或 $\mathbb{R}^n$) 上的内积, 则对任意 $x, y \in \mathbb{C}^n$ (或 $\mathbb{R}^n$), 有

$$|(x, y)| \leq \|x\|_p \cdot \|y\|_q,$$

其中 $p, q > 0$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

(留作课外自习)

内积导出范数

设 $\mathbb{S}$ 是内积空间, 对任意 $x \in \mathbb{S}$, 定义

$$\|x\| \triangleq (x, x)^{\frac{1}{2}},$$

则可以验证, $\|x\|$ 是 $\mathbb{S}$ 上的范数. 这就是由内积导出的范数



任意一个内积都可以导出一个相应的范数.

例 $\mathbb{R}^n/\mathbb{C}^n$ 上由标准内积导出的范数为 $\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$

矩阵范数

定义 若函数 $f: \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ (或 $f: \mathbb{C}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$) 满足

- (1) $f(A) \geq 0, \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{m \times n}$) 且等号当且仅当 $A = 0$ 时成立;
- (2) $f(\alpha A) = |\alpha| f(A), \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{m \times n}$), $\alpha \in \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$);
- (3) $f(A + B) \leq f(A) + f(B), \forall A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{m \times n}$);

则称 $f(X)$ 为 $\mathbb{R}^{m \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{m \times n}$) 上的矩阵范数, 通常记作 $\|X\|$.

设 f 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{n \times n}$) 上的矩阵范数, 如果 f 还满足

- (4) $f(AB) \leq f(A)f(B), \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{n \times n}$),

则称 f 是 **相容的矩阵范数** (本讲义中所涉及的矩阵范数默认是指相容的矩阵范数)

算子范数

引理 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 上的向量范数, 则

$$\|A\| \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{n \times n}$) 上的矩阵范数, 称为**算子范数**, 有时也称为**诱导范数**或**导出范数**.

(留作练习, 验证定义中的四个条件即可)



相应地, 可以定义 $\mathbb{R}^{m \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{m \times n}$) 上的算子范数, 此时涉及 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^m$ 和 $\mathbb{C}^n$) 上的向量范数.

例 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{n \times n}$), 常见的矩阵范数有:

➤ p -范数 (算子范数)

$$\|A\|_p = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}, \quad p \geq 1.$$

➤ Frobenius 范数, 简称 F -范数

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2};$$

引理 可以证明:

(1) 矩阵 1-范数 (列范数): $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right);$

(2) 矩阵 ∞ -范数 (行范数): $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right);$

(3) 矩阵 2-范数: $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^*A)};$

(4) 矩阵 F -范数: $\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^*A)}$

(板书, 以 ∞ -范数和 2-范数为例, 1-范数和 F -范数留作练习)

定理 (矩阵范数的等价性) $\mathbb{R}^{n \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{n \times n}$) 上的所有范数都是等价的, 特别地, 有

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_1 \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1, \quad \frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_\infty.$$

(留作练习)

矩阵范数的更多性质

- (1) 对任意矩阵范数 $\|\cdot\|$, 有 $\|A^k\| \leq \|A\|^k$;
- (2) 对任意算子范数 $\|\cdot\|$, 有 $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$, $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$;
- (3) $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_F \cdot \|x\|_2$, $\|AB\|_F \leq \|A\|_F \cdot \|B\|_F$;
- (4) F -范数不是算子范数;
- (5) $\|\cdot\|_2$ 和 $\|\cdot\|_F$ 是酉不变范数, 即对任意酉矩阵 (或正交矩阵) U, V , 有

$$\|UA\|_2 = \|AV\|_2 = \|UAV\|_2 = \|A\|_2,$$

$$\|UA\|_F = \|AV\|_F = \|UAV\|_F = \|A\|_F$$

- (6) $\|A^*\|_2 = \|A\|_2$, $\|A^*\|_1 = \|A\|_\infty$;
- (7) 若 A 是正规矩阵, 则 $\|A\|_2 = \rho(A)$.

(留作课外自习)

矩阵直和

设 $A_i \in \mathbb{R}^{n_i \times n_i}$ (或 $\mathbb{C}^{n_i \times n_i}$), $i = 1, 2, \dots, k$, 定义 **直和**

$$\bigoplus_{i=1}^k A_i = A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_k \triangleq \begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{bmatrix},$$

即以 A_i 为对角块的块对角矩阵. 可以验证

$$\left\| \bigoplus_{i=1}^k A_i \right\|_p = \max_{1 \leq i \leq k} \|A_i\|_p, \quad p = 1, 2, \infty.$$

谱半径与范数

定理 (谱半径与范数的关系) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{n \times n}$), 则

- (1) 对任意算子范数, 有 $\rho(A) \leq \|A\|$;
- (2) 反之, 对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在一个算子范数 $\|\cdot\|_\varepsilon$, 使得 $\|A\|_\varepsilon \leq \rho(A) + \varepsilon$, 其中范数 $\|\cdot\|_\varepsilon$ 依赖于 A 和 ε . 所以, 若 $\rho(A) < 1$, 则存在算子范数 $\|\cdot\|_\varepsilon$, 使得 $\|A\|_\varepsilon < 1$;

(板书)



事实上, 定理中的结论 (1) 对任意矩阵范数都成立, 留作练习.

推论 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{n \times n}$), 则

$$\|A\|_2^2 \leq \|A\|_1 \|A\|_\infty,$$

且

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} \{|a_{ij}|\} \leq \|A\|_2 \leq n \max_{1 \leq i, j \leq n} \{|a_{ij}|\}.$$

(留作练习, 利用矩阵特征值与迹的关系)

最佳逼近与正交投影

正交投影变换的一个常用性质

定理 设 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{n \times n}$) 是正交投影矩阵, 则 $\|P\|_2 = 1$, 且对 $\forall x \in \mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$), 有

$$\|x\|_2^2 = \|Px\|_2^2 + \|(I - P)x\|_2^2.$$

用正交投影表示最佳逼近问题的解

定理 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 的子空间, $z \in \mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 是一个给定的向量, 则最佳逼近问题

$$\min_{x \in S} \|x - z\|_2$$

的唯一解为

$$x_* = P_S z.$$

即 S 中距离 z 最近 (在 2-范数意义下) 的向量是 z 在 S 中的正交投影.

(留作练习)

上述定理中的 2-范数可以推广到一般的能量范数.

推论 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (或 $\mathbb{C}^{n \times n}$) 对称正定 (或 Hermite 正定), $\mathbb{S}$ 是 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 的子空间, 给定 $z \in \mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$), 则 x_* 是最佳逼近问题

$$\min_{x \in \mathbb{S}} \|x - z\|_A$$

的解的充要条件是

$$x_* \in \mathbb{S} \quad \text{且} \quad A(x_* - z) \perp \mathbb{S}.$$

此处**能量范数** $\|\cdot\|_A$ 的定义为: $\|x - z\|_A \triangleq \sqrt{(x - z)^* A (x - z)}$.

(留作练习)

4 | 矩阵标准型

计算矩阵特征值的一个基本思想

通过相似变换, 将其转化成一个形式尽可能简单的矩阵, 使得其特征值更易于计算.

两个典型的矩阵标准型: Jordan 标准型和 Schur 分解

Jordan 标准型

定理 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 有 p 个不同特征值, 则存在非奇异矩阵 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得

$$X^{-1}AX = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_p \end{bmatrix} \triangleq J, \quad (\text{Jordan 标准型})$$

其中 J_i 的维数等于 λ_i 的代数重数, 且具有下面的结构

$$J_i = \begin{bmatrix} J_i^{(1)} & & \\ & J_i^{(2)} & \\ & & \ddots \\ & & & J_i^{(\nu_i)} \end{bmatrix}, \quad J_i^{(k)} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_i & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}.$$

这里的 ν_i 为 λ_i 的几何重数, $J_i^{(k)}$ 称为 (对应于 λ_i 的) **Jordan 块**.

另一种描述

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则存在非奇异矩阵 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$X^{-1}AX = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_\ell \end{bmatrix},$$

其中

$$J_k = \begin{bmatrix} \lambda_k & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_k & 1 \\ & & & \lambda_k \end{bmatrix}_{n_k \times n_k}, \quad n_k \geq 1, \quad k = 1, 2, \dots, \ell, \quad \text{且} \quad \sum_{k=1}^{\ell} n_k = n.$$

矩阵 J_k 就称为 **Jordan 块**, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\ell$ 是 A 的特征值 (不要求互异).

Jordan 标准型的基本性质

- ▶ 除了 Jordan 块的排列次序外, Jordan 标准型是唯一确定的.
- ▶ Jordan 块的个数等于 A 的线性无关的特征向量的个数;
- ▶ A 可对角化的充要条件是每个 Jordan 块都是 1×1 的, 此时 X 的列向量就是 A 的特征向量.
- ▶ 可以证明, 对于每一个 Jordan 块 $J_i^{(k)}$, 都存在一个列满秩矩阵 $X_i^{(k)}$ 使得

$$AX_i^{(k)} = X_i^{(k)} J_i^{(k)}.$$

Jordan 标准型的应用

推论 所有可对角化矩阵组成的集合在所有矩阵组成的集合中是稠密的, 即任何一个矩阵都可以通过可对角化矩阵来逼近.

Jordan 标准型的另一个重要应用是可以用来计算矩阵的最小多项式.

定理 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ 为 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的互不相等的特征值, 则 A 的最小多项式为

$$p(\lambda) = \prod_{i=1}^q (\lambda - \lambda_i)^{r_i},$$

其中 r_i 是与 λ_i 所对应的最大 Jordan 块的维数.

Schur 分解

定理 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ (或 $\mathbb{R}^{n \times n}$), 则存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$U^*AU = \begin{bmatrix} \lambda_1 & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} \triangleq R \quad \text{或} \quad A = URU^*,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值 (可以按任意顺序排列).

(板书)

关于 Schur 分解的几点说明

- ▶ 该结论告诉我们, 任意一个矩阵都可以酉三角化.
- ▶ 三角矩阵可以说是一般矩阵在酉相似变化下的最简形式.
- ▶ 定理中的 U 和 R 不是唯一的.
- ▶ R 的对角线元素可以按任意顺序排列, 特别地, 可以按模从大到小排列.

推论 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则

- (1) A 是正规矩阵当且仅当 R 是对角矩阵,
即 A 可酉对角化当且仅当 A 是正规矩阵;
- (2) A 是 Hermite 矩阵当且仅当 R 是实对角矩阵.

实 Schur 分解 (或拟 Schur 分解)

定理 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则存在正交矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$Q^T A Q = T,$$

其中 $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是**拟上三角矩阵**, 即 T 是块上三角的, 且对角块为 1×1 或 2×2 的块矩阵. 若对角块是 1×1 的, 则其就是 A 的一个特征值, 若对角块是 2×2 的, 则其特征值是 A 的一对共轭复特征值.

(板书)

5 | 几类特殊矩阵

对称正定矩阵

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

- ▶ 若对所有向量 $x \in \mathbb{C}^n$ 有 $\operatorname{Re}(x^*Ax) \geq 0$, 则称 A 是**半正定**的;
- ▶ 若对所有非零向量 $x \in \mathbb{C}^n$ 有 $\operatorname{Re}(x^*Ax) > 0$, 则称 A 是**正定**的;
- ▶ 若 A 是 Hermite 的且半正定, 则称 A 为 **Hermite 半正定**;
- ▶ 若 A 是 Hermite 的且正定, 则称 A 为 **Hermite 正定**;
- ▶ 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称的且半正定, 则称 A 为**对称半正定**;
- ▶ 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称的且正定, 则称 A 为**对称正定**.



本讲义中, 正定和半正定矩阵不要求是对称或 Hermite.

对称正定矩阵的判别

定理 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则

- (1) A 正定的充要条件是 $H = \frac{1}{2}(A + A^*)$ 正定;
- (2) A 半正定的充要条件是 $H = \frac{1}{2}(A + A^*)$ 半正定.

(留作练习)

定理 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则 A 正定 (或半正定) 的充要条件是对任意非零向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 有 $x^T A x > 0$ (或 $x^T A x \geq 0$).

(留作练习)

 该结论表明: 如果 A 是实矩阵, 则只需在实数域中考虑即可.

对称正定矩阵的基本性质

- (1) A Hermite 正定当且仅当 A Hermite 且所有特征值都是正的;
- (2) A Hermite 正定当且仅当存在酉矩阵 U 使得 $A = U\Lambda U^*$, 其中 Λ 为对角矩阵且对角线均为正实数;
- (3) A Hermite 正定当且仅当 S^*AS 对称正定, 其中 $S \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是一个任意的非奇异矩阵;
- (4) 若 A Hermite 正定, 则 A 的任意主子矩阵都 Hermite 正定;
- (5) 若 A Hermite 正定, 则 A 的所有对角线元素都是正的, 且 $\max_{i \neq j} \{|a_{ij}|\} < \max_i \{a_{ii}\}$, 即绝对值最大的元素出现在对角线上.

定理 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是一个 Hermite 半正定矩阵, k 是一个给定的正整数. 则存在唯一的 Hermite 半正定矩阵 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$B^k = A.$$

同时, 我们还有下面的性质:

- (1) $\text{rank}(B) = \text{rank}(A)$, 因此, 若 A 是正定的, 则 B 也正定;
- (2) 如果 A 是实矩阵的, 则 B 也是实矩阵.

特别地, 当 $k = 2$ 时, 称 B 为 A 的**平方根**, 记为 $A^{\frac{1}{2}}$.

(留作课外自习)

Hermite 正定矩阵与内积

定理 设 $(\cdot, \cdot)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的一个内积, 则存在一个 Hermite 正定矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$(x, y) = y^* Ax.$$

反之, 若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 正定矩阵, 则

$$f(x, y) \triangleq y^* Ax$$

是 $\mathbb{C}^n$ 上的一个内积.

(留作练习)



定理的结论在实数域中也成立.

对角占优矩阵

定义 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

对所有 $i = 1, 2, \dots, n$ 都成立, 且至少有一个不等式严格成立, 则称 A 为**弱行对角占优**, 简称**弱对角占优**或**对角占优**. 若所有不等式都严格成立, 则称 A 是**严格行对角占优**, 简称**严格对角占优**.



类似地, 可以定义**列对角占优**和**严格列对角占优**.

严格对角占优矩阵的非奇异性

定理 若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是严格对角占优矩阵, 则 A 非奇异.

(板书)

 如果 A 是严格对角占优的, 则可以给出 $\|A^{-1}\|_1$ 的一个估计.

定理 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 严格列对角占优, 记

$$\delta \triangleq \min_{1 \leq j \leq n} \left(|a_{jj}| - \sum_{i=1, i \neq j}^n |a_{ij}| \right) > 0,$$

则有 $\|A^{-1}\|_1 \leq \delta^{-1}$.

(留作练习)

可约矩阵与不可约矩阵

定义 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 如果存在置换矩阵 P 使得 PAP^T 为块上三角矩阵, 即

$$PAP^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{11} \in \mathbb{C}^{k \times k}, \quad A_{22} \in \mathbb{C}^{(n-k) \times (n-k)}$$

其中 $1 \leq k < n$, 则称 A 是**可约**的, 否则就称 A 为**不可约**的.

不可约的意义

若 A 可约, 即存在置换矩阵 P , 使得 $PAP^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$,
则 $Ax = b$ 等价于 $(PAP^T)(Px) = Pb$. 记 $y \triangleq Px$, $f \triangleq Pb$, 则

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}.$$

- ▶ 因此, 原方程组就转化为两个更小规模的子方程组.
 - ▶ 对于特征值问题, A 的特征值就是 A_{11} 和 A_{22} 的特征值的并.
- 如果 A_{22} 或 A_{11} 仍然是可约的, 则可以转化为更小规模的子问题.

可约与对角线元素无关

由于 PAP^T 保持 A 的对角线元素仍然在对角线上, 因此主对角线元素是否为零并不影响矩阵的可约性.

推论 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 不可约, 则 $A + D$ 也不可约, 其中 D 是任意对角矩阵. 特别地, $B \triangleq A - \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ 不可约.

可约矩阵的幂

如果 A 可约, 则对任意正整数 k , 有

$$PA^kP^T = (PA P^T)^k = \begin{bmatrix} A_{11}^k & \tilde{A}_{12}^{(k)} \\ 0 & A_{22}^k \end{bmatrix}.$$

定理 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 若 A 可约, 则 A^k 也可约. 反之, 若存在一个正整数 k , 使得 A^k 是不可约的, 则 A 也不可约.



不可约矩阵的幂不一定不可约. 如 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 但 $A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 可约.

矩阵可约的充要条件（一）

定理 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 指标集 $\mathbb{Z}_n = \{1, 2, \dots, n\}$, 则 A 可约的充要条件是存在非空指标集 $\mathcal{S}, \mathcal{T} \subset \mathbb{Z}_n$ 满足 $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T} = \mathbb{Z}_n$, 使得

$$a_{ij} = 0, \quad i \in \mathcal{S}, \quad j \in \mathcal{T}.$$

(留作课外自习)

矩阵可约的充要条件 (二)

定理 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 指标集 $\mathbb{Z}_n = \{1, 2, \dots, n\}$, 则 A 可约的充要条件是存在两个相异的正整数 $k, l \in \mathbb{Z}_n$, 使得对任意指标序列 $\{i_1, i_2, \dots, i_r\} \subseteq \mathbb{Z}_n$, 都有

$$a_{ki_1} a_{i_1 i_2} \cdots a_{i_r l} = 0.$$

这里 $r > 0$ 是任意正整数.

(留作课外自习)

等价描述

矩阵 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 不可约的充要条件是: 对任意两个相异正整数 $k, l \in \mathbb{Z}_n$, 都存在一个指标序列 $\{i_1, i_2, \dots, i_m\} \subseteq \mathbb{Z}_n$ 使得

$$a_{ki_1} a_{i_1 i_2} \cdots a_{i_m l} \neq 0.$$

不可约对角占优矩阵

定理 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是不可约的弱对角占优矩阵, 则 A 非奇异.

(留作练习, 仿照严格对角占优, 再利用不可约充要条件 (一))


一个有意思的现象

通常, 如果某个元素全不为零的矩阵具有某种性质, 则这个性质往往能够推广到不可约矩阵.

其他常见特殊矩阵

带状矩阵:

$a_{ij} \neq 0$ only if $-b_u \leq i - j \leq b_l$, 其中 b_u 和 b_l 为非负整数, 分别称为下带宽和上带宽,
 $b_u + b_l + 1$ 称为 A 的带宽



➤ 上 Hessenberg 矩阵: $a_{ij} = 0$ for $i - j > 1$,

$$\begin{bmatrix} * & * & * & \cdots & * \\ * & * & * & \cdots & * \\ & * & * & \cdots & * \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & * & * \end{bmatrix}$$

➤ 下 Hessenberg 矩阵

$$\begin{bmatrix} * & * & & & \\ * & * & * & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ * & * & \cdots & * & * \\ * & * & \cdots & * & * \end{bmatrix}$$

➤ Toeplitz 矩阵:

$$T = \begin{bmatrix} t_0 & t_{-1} & \cdots & t_{-n+1} \\ t_1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & t_{-1} \\ t_{n-1} & \cdots & t_1 & t_0 \end{bmatrix}$$

➤ 循环矩阵 (circulant): 一类特殊的 Toeplitz 矩阵

$$C = \begin{bmatrix} c_0 & c_{n-1} & c_{n-2} & \cdots & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_{n-1} & \cdots & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n-1} & c_{n-2} & c_{n-3} & \cdots & c_0 \end{bmatrix}$$

➤ Hankel 矩阵:

$$H = \begin{bmatrix} h_0 & h_1 & \cdots & h_{n-2} & h_{n-1} \\ h_1 & \ddots & \ddots & \ddots & h_n \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ h_{n-2} & \ddots & \ddots & \ddots & h_{2n-2} \\ h_{n-1} & h_n & \cdots & h_{2n-2} & h_{2n-1} \end{bmatrix}$$

Hankel 矩阵与 Toeplitz 矩阵

设 $J = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & \ddots & \\ 1 & & \end{bmatrix}$, 则 JH 是 Toeplitz 矩阵.

6 | Kronecker 积

定义 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{p \times q}$, 则 A 与 B 的 **Kronecker 积** 定义为

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{mp \times nq}.$$

Kronecker 积也称为**直积**, 或**张量积**.



任意两个矩阵都存在 Kronecker 积, 但通常 $A \otimes B \neq B \otimes A$. ($A \otimes B$ 和 $B \otimes A$ 有什么关系?)

Kronecker 积基本性质

$$(1) (\alpha A) \otimes B = A \otimes (\alpha B) = \alpha(A \otimes B), \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$$

$$(2) (A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T, \quad (A \otimes B)^* = A^* \otimes B^*$$

$$(3) (A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$$

$$(4) (A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$$

$$(5) A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$$

$$(6) \text{rank}(A \otimes B) = \text{rank}(A) \text{rank}(B)$$

$$(7) \text{混合积: } (A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$$

$$(A_1 \otimes A_2 \otimes \cdots \otimes A_k)(B_1 \otimes B_2 \otimes \cdots \otimes B_k)$$

$$= (A_1 B_1) \otimes (A_2 B_2) \otimes \cdots \otimes (A_k B_k)$$

$$(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) \cdots (A_k \otimes B_k) = (A_1 A_2 \cdots A_k) \otimes (B_1 B_2 \cdots B_k)$$

Kronecker 积的特征值

推论 设 $A = Q_1 \Lambda_1 Q_1^{-1} \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $B = Q_2 \Lambda_2 Q_2^{-1} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则

$$A \otimes B = (Q_1 \otimes Q_2)(\Lambda_1 \otimes \Lambda_2)(Q_1 \otimes Q_2)^{-1}.$$

定理 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 并设 (λ, x) 和 (μ, y) 分别是 A 和 B 的一个特征对, 则 $(\lambda\mu, x \otimes y)$ 是 $A \otimes B$ 的一个特征对. 由此可知, $B \otimes A$ 与 $A \otimes B$ 具有相同的特征值.

推论 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $A \otimes I_n + I_m \otimes B$ 的特征值为 $\lambda_i + \mu_j$, 其中 λ_i 和 μ_j 分别为 A 和 B 的特征值.

Kronecker 积的迹和逆

定理 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则

- (1) $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A)\text{tr}(B)$;
- (2) $\det(A \otimes B) = \det(A)^n \det(B)^m$;
- (3) 若 A 和 B 都非奇异, 则 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$.

Kronecker 积与向量的乘积

定理 设矩阵 $X = [x_1, x_2, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 记 $\text{vec}(X)$ 为 X 按列拉成的 mn 维列向量, 即

$$\text{vec}(X) = [x_1^\top, x_2^\top, \dots, x_n^\top]^\top,$$

则有

$$\text{vec}(AX) = (I \otimes A)\text{vec}(X), \quad \text{vec}(XB) = (B^\top \otimes I)\text{vec}(X),$$

以及

$$(A \otimes B)\text{vec}(X) = \text{vec}(BXA^\top).$$



$\text{vec}(X)$ 称为**向量化算子**或**拉直算子**. 该结论对节省运算量和存储量都有好处.

定理 Sylvester 矩阵方程

$$AX + XB = D$$

等价于代数方程

$$(I \otimes A + B^{\top} \otimes I) \text{vec}(X) = \text{vec}(D).$$

课后练习: 见讲义

本讲主要参考文献

- ▶ R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 1985. 2nd edition, 2013.
- ▶ R. A. Horn and C. R. Johnson, *Topics in Matrix Analysis*, 1991.
- ▶ 戴华, 矩阵论, 2001.

- G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 5th edition, 2016.
- D. C. Lay, S. R. Lay and J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*, 6th edition, 2022.





FIGURE 4 A shear transformation.




FIGURE 1 Directions determined by $\mathbf{x}, A\mathbf{x}, A^2\mathbf{x}, \dots, A^7\mathbf{x}$.

谢谢
THANK YOU

